

ANTI-AGE M-COMPLEX коктейль

Ref. K 83

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

- Диметиламиноэтанол (DMAE) -3%
- Ацетил-гексапептид-8 (Аргирелин)
- Пируват натрия
- Гиалуроновая кислота
- L-карнитин

Ацетил-гексапептид-8 (Аргирелин) – биотехнологический пептидный комплекс из шести аминокислот, действующий подобно ботулотоксину. Благодаря своему сходству с белком SNAP- 25, он прерывает передачу нервного импульса на уровне нейро-мышечного синапса. Ацетилгексапептид-8 встраивается вместо этого белка в синаптический комплекс SNAR, блокирует выделение нейромедиатора ацетилхолина, замедляет проведение нервного импульса, мягко расслабляет мимическую мускулатуру. В отличие от препаратов на основе ботулинического токсина, Аргирелин безвреден, не вызывает привыкания и осложнений.

Пируват натрия – принимает участие в цикле Кребса. Нормализует энергоснабжение и метаболические процессы в клетках. Выполняет роль антиоксиданта, защищает нуклеиновые кислоты от повреждения, а так же стимулирует синтетическую активность фибробластов и увеличивает выработку коллагена.

Диметиламиноэтанол (DMAE) – естественный метаболит организма человека, предшественник ацетилхолина. Внутрикожное введение DMAE приводит к локальному повышению концентрации ацетилхолина и запускает каскад биохимических реакций, результатом которых являются ярко выраженный лифтинг-эффект, вазодилатация, восстановление водного баланса и регенераторного потенциала клеток. DMAE так же уплотняет кожу и разглаживает ее поверхность, устранив мелкие морщины.

Гиалуроновая кислота – является одним из важнейших компонентов кожи, где она выполняет влагоудерживающую, метаболическую, сигнальную и структурную функцию. Препараты на основе гиалуроновой кислоты позволяют восстановить должный уровень гидратации, замедлить возрастную деградацию тканей, сделать поверхность кожи ровной и сияющей.

L- карнитин – стимулирует метаболические процессы в клетках, а так же является мощным антиоксидантом.

Курс процедур

С профилактической целью рекомендуется курс из 4-х процедур с периодичностью 1 раз в 7-10 дней.

Терапевтический курс должен составлять до 10 процедур, проводимых 1 раз в неделю.

Побочные эффекты

После введения препарата может возникнуть умеренная гиперемия, которая сохраняется от 30 минут до 3-4 часов. Как правило, это явление не сопровождается ощущением дискомфорта, зуда или жжения. Покраснение проходит самостоятельно.

Форма выпуска

5 флаконов по 10 мл в картонной коробке