

# CELLULITE REDUCER коктейль

## Ref. К 81

### АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

- Карнитин
- Кофеин
- Фосфатидилхолин
- Дезоксихолат натрия
- Экстракт центеллы азиатской
- Экстракт иглицы шиповатой

**Карнитин** - незаменимый фактор обмена жирных кислот. Транспортирует образовавшиеся при гидролизе триглицеридов свободные жирные кислоты через мембраны митохондрий, тем самым обеспечивает их утилизацию. Является антиоксидантом, стабилизирует мембраны клеток.

**Кофеин** – является непрямым липолитиком, ингибирует фосфолиэстеразу и стимулирует бета-адренорецепторы адипоцита с последующей активизацией липолиза и расщеплением триглицеридов до жирных кислот и глицерола. Обладает вазоактивным и умеренным диуретическим действием.

**Фосфатидилхолин** – повышает активность триглицеридлипазы, активирует расщепление жиров, облегчает утилизацию конечных продуктов липолиза.

**Дезоксихолат натрия** – прямой липолитик. Вызывает цитолиз жировых клеток и высвобождение триглицеридов в межклеточное пространство.

**Иглица шиповатая** – нормализует венозное и лимфатическое обращение, обладает венотоническим действием.

**Центелла азиатская** - укрепляет стенки кровеносных и лимфатических сосудов, уменьшает их проницаемость, препятствует развитию межклеточного отека и уменьшает избыточную капиллярную фильтрацию. Стимулирует липолиз, подавляет активность альфа-2-адренорецепторов.

#### Противопоказания

- Желчнокаменная болезнь
- Мочекаменная болезнь
- Не рекомендуется пациентам с липодистрофией 3-4 стадии

#### Способ применения

Коктейль рекомендуется вводить в подкожно-жировую клетчатку. В шахматном порядке через каждые 2,0-2,5 см. За раз вводится не более 10 мл препарата.

#### Курс процедур

Препарат следует вводить 1 раз в 3-4 недели. Рекомендуемый курс лечения составляет от 6 до 8 процедур.

#### Побочные эффекты

Через несколько минут после введения препарата могут появляться: умеренная гиперемия кожных покровов, боль, зуд, жжение, чувство распирания, отек, а также гематомы. Побочные явления могут сохраняться в течении нескольких суток и, как правило, проходят самостоятельно. Для их коррекции следует применять наружные средства (крем, мазь) с противовоспалительным, сосудосуживающим, регенерирующим и рассасывающим действием.

#### Форма выпуска

5 флаконов по 10 мл в картонной коробке